Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

votre plante, qui n'a pas les folioles oblongues comme le dit Koch, mais dont *toutes* les folioles sont lancéolées. Par cette considération, je crois que la plante d'Oosterloo doit constituer une espèce nouvelle, que je nomme *T. princeps* à cause de sa stature majestueuse. »

Je n'ai rien à ajouter à ces explications, sinon de manifester la crainte de voir bientôt cette belle plante disparaître. Tous les ans, on enlève de la tourbe des riches marécages d'Oosterloo et les pieds du *T. princeps* deviennent de plus en plus rares.

Notes sur la florule des environs de Jodoigne, par Joseph Thys.

Depuis plusieurs années, j'étudie la végétation indigène des environs de Jodoigne. Les herborisations que j'ai faites, soit seul, soit en compagnie de mon ami M. Antoine, ont amené la découverte d'un certain nombre de plantes plus ou moins rares et de plusieurs formes qui paraissent inédites.

Déjà M. Antoine a fait connaître une partie des espèces les plus curieuses du canton de Jodoigne, dans une notice insérée dans ce même volume du *Bulletin*, p. 215-218. Mon intention est de compléter plus ou moins ce premier travail, en y ajoutant certaines espèces des moins vulgaires du canton et en attirant l'attention sur diverses formes nouvelles.

Dongelberg, le 1er décembre 1869.

Clematis Vitalba L. — Haies et buissons. C.

Anemone ranunculoides L. — Le long de la Geete à Jodoigne-Souveraine. C. C.

Myosurus minimus L. — Dongelberg. R.

Ranunculus sceleratus L. — Dongelberg, Opprebais. R.

Saponaria officinalis L. — Bords de la Geete à Jodoigne-Souveraine. C.

Cerastium aquaticum L. — Dongelberg, Jodoigne. A. R.

Stellaria uliginosa Murr. — Jodoigne-Souveraine, Dongelberg. A. R.

Malva moschata L. — Opprebais. R.

Polygala depressa Wend. — Jauchelette. A. C.

Acer campestre L. — Bois et buissons. A. C.

Evonymus europaeus L. — Bois et bords des eaux. C.

Hypericum tetrapterum Fries. — Dongelberg. A. C.

— **quadrangulum** L. — Dongelberg, Jodoigne-Souveraine. A. C.

Drosera rotundifolia L. — Bonlez. A. R.

Reseda Luteola L. — Jodoigne. R.

Nymphaea alba L. — Dans une carrière de craie inondée à Grez. Spontané ?

Corydalis lutea DC. — Vieux murs. Jodoigne. R.

Cheiranthus Cheiri L. — Vieux murs. Jodoigne. A. R.

Barbarea intermedia Bor. — Chapelle-St-Laurent, Dongelberg. R.

Hesperis matronalis L. — Pelouses à Dongelberg, champ de trèfle à Opprebais. R.

Erucastrum Pollichii Schimp. et Spen. — Trouvé un pied en 1869 dans un nouveau pré ensemencé à Dongelberg. — Probablement introduit.

Senebiera Coronopus Poir. — Malèves. R.

Viola canina L. — Incourt. R.

Ulex europaeus L. — Bois à Beausart, talus de la route de Wavre à Hannut.

Melilotus albus Desr. — Rouxmiroir. R.

Lathyrus Nissolia L. — Rouxmiroir. R.

Orobus tuberosus L. — Piétrebais. A. C.

Sedum reflexum L. — Rochers. Jodoigne. R.

— **album** L. — Rochers. Dongelberg. R.

— **acre** L. — Chapelle-St-Laurent, Biez. C.

Rubus caesius. L. — C.

Fragaria elatior Ehrh. — Biez, Jauche. R.

Potentilla argentea L. — R.

Rosa arvensis L. — C.

— **tomentosa** Sm. — Dongelberg, Piétrebais. A. R.

Alchemilla vulgaris L. — Bois de la Chise à Piétrebais. R.

Poterium dictyocarpum Spach. — Dongelberg. R.

Mespilus germanica L. — Bois et haies. Dongelberg, Heze, Biez. A. C.

Epilobium spicatum Lmk. — Dongelberg, Molembais-St-Josse. C.

— **lanceolatum** Seb. et Maur. — Piétrebais, Dongelberg. R.

Oenothera biennis L. — Dongelberg. A. C.

Circaea lutetiana L. — C.

Myriophyllum verticillatum L. — Jodoigne. R.

Conium maculatum L. — Dongelberg, Piétrebais. R.

Cornus mas L. — Bois de St-Servais à Melin. R.

Vinca minor L. — Dongelberg. C.

Menyanthes trifoliata L. — Lathuy, Dongelberg. A. C.

Erythraea pulchella Fries. — Piétrebais. R.

Cuscuta Epilinum Weihe. — Piétrebais.

Borrago officinalis L. — Dongelberg, Rouxmiroir.

Lycopsis arvensis L. — A. C.

Nicandra physalodes Gärtn. — Jodoigne.

Hyoscyamus niger L. — Dongelberg, Rouxmiroir.

— — var. **agrestis**. — Longpré.

Verbascum phlomoides L. — Jodoigne-Souveraine (un pied, 1857).

— **nigrum** L. — Lathuy, Dongelberg. A. C.

Veronica persica Poir. — Moissons. Piétrebais.

— **Anagallis** L. — Jodoigne. A. R.

Antirrhinum Orontium L. — Dongelberg. R.

Linaria Cymbalaria Mill. — Dongelberg. R.

Pedicularis sylvatica L. — Chaumont.

— **palustris** L. — Dongelberg, Lathuy.

Mentha viridis L. — Piétrebais. R.

— **sativa** L. — C.

Nepeta Cataria L. — Jodoigne-Souveraine, Glimes, Bonlez. A. R.

Galeopsis speciosa Mill. — Geest-Ste-Marie. R.

Stachys annua L. — Champs. Piétrebais (1869). R.

Ballota nigra L. — C. — Depuis 1867, j'observe avec M. Antoine une forme à feuilles ne noircissant pas par la dessiccation, plus petites, arrondies, obscurément dentées; les fleurs sont blanches, à anthères jaunes. Cette forme, qui s'est reproduite naturellement de graines en 1868 et 1869 et conservant ses caractères, est moins robuste que le *B. nigra*. Elle mérite d'être attentivement étudiée.

Campanula Trachelium L. — Bois et buissons. C.

Phyteuma spicatum L. — Bois de St-Servais à Melin. — Le type y est mélangé avec sa variété *nigrum*.

Jasione montana L. — Jodoigne-Souveraine, Piétrebais, Chapelle-St-Laurent.

Galium uliginosum L. — Jodoigne-Souveraine. A. C.

Valeriana dioeca L. — Dongelberg, Bonlez. A. R.

Dipsacus sylvestris Mill. — Grez. R.

Onopordon Acanthium L. — Geest-St-Remy, Chapelle-St-Laurent.

Lappa officinalis All. — Jodoigne-Souveraine, Opprebais.

Centaurea Jacea L. — C.

Obs. — Je crois devoir attirer l'attention sur la forme remarquable dont il a été question dans le *Bulletin*, t. VII, p. 228. C'est au mois de juin 1868 que je l'ai observée à Dongelberg. Elle est bien différente des formes ou espèces démembrées du *C. Jacea* qui ont été jusqu'ici observées en Belgique. Je la considérai tout d'abord comme appartenant au *C. amara* L.

Selon moi, et mon confrère M. Antoine partage mon avis, cette plante est intermédiaire entre les *C. Jacea* et *C. amara*. Elle diffère du premier par son facies, qui est caractéristique, par ses fleurons extérieurs plus largement rayonnants et purpurins, par son involucre ovoïde et non globuleux, contracté au sommet, par ses écailles à appendices non ciliés, mais frangés, plus profondément laciniés surtout les supérieurs, d'un blanc-fauve ou brunâtres. Ses feuilles radicales sont pétiolées, lancéolées, peu ou point pinnatifides ; les supérieures sont oblongues et lancéolées, comme dans le *C. Jacea,* mais moins rudes et plus aranéeuses-blanchâtres, ainsi que la tige. Les akènes sont blanchâtres, un peu pubescents, ovales-oblongs, dépourvus d'aigrette ou à aigrette rudimentaire. Elle diffère du *C. amara* par ses écailles de l'involucre, par sa floraison moins tardive, qui a lieu en juin et juillet et non en août et septembre et par divers autres caractères. Si cette forme est reconnue comme espèce distincte, je propose de la désigner sous le nom de *C. Dumortieri* en l'honneur de M. Du Mortier, président de la Société.

Pyrethrum Parthenium L. — Il semble être indigène aux environs de Jodoigne. A Dongelberg, le type s'y rencontre avec la variété à fleurons tous ligulés ; à Piétrebais, s'y observe une forme à fleurons ligulés très-petits.

Artemisia Absinthium L. — Subspontané sur les coteaux à Dongelberg et Jauche. R.

Antennaria dioeca Gärtn. — Chaumont. A. R.

Inula Helenium L. — Quelques pieds à Rouxmiroir. — Subspontané.

Senecio Fuchsii Gmel. — Bois de Merdael.

Petasites officinalis Mönch. — Jodoigne-Souveraine aux bords de la Geete. R.

Arnoseris minima Link. — Heze.

Lactuca muralis Less. — Dongelberg. R.

Hieracium dentatum Fries. — Dongelberg. R.

— **boreale** Fries. — C.

Euxolus viridis Moq.-Tand. — A. R.

Chenopodium Vulvaria L. — Jodoigne. C.

— **glaucum** L. — Dongelberg.

Blitum Bonus-Henricus Rchb. — Jodoigne-Souveraine. R.

Polygonum dumetorum L. — Dongelberg, Piétrebais. R.

Euphorbia Lathyris L. — Dongelberg. R. — Subspontané.

Ceratophyllum submersum L. — Dongelberg.

Juniperus communis L. — Collines arides. Chaumont. R.

Colchicum autumnale L. — Incourt, Wastines.

Paris quadrifolia L. — Piétrebais, Dongelberg. R.

Narcissus Pseudo-Narcissus L. — Bois. Dongelberg. R.

Orchis mascula L. — Jodoigne-Souveraine. C.

Gymnadenia viridis Rich. — Jodoigne-Souveraine, Wastines. A. R.

Platanthera montana Rchb. f. — Bois de St-Servais, Dongelberg. A. R.

Epipactis latifolia All. — Bois. A. C.

Neottia Nidus-avis Rich. — Dongelberg. R.

Triglochin palustris. L. — Dongelberg.

Zannichellia palustris L. — Dans la Geete à Jodoigne-Souveraine.

Lemma gibba L. — C.

Typha angustifolia L. — Bonlez. R.

Luzula nemorosa Poll. — Dongelberg. R.

Carex rostrata With. — Dongelberg. R.

Eriophorum latifolium Hoppe. — Dongelberg. R.

Setaria glauca P. Beauv. — Heze. C.

Glyceria plicata Fries. — Basse-Wavre.

Blechnum Spicant L. — Ravins. Bonlez.

Aspidium lobatum Huds. — Gottechain. R.

Equisetum maximum Lmk. — Bois de St-Pierre à Jauchelette.